

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah :

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.
Obecné kontraindikace lázeňské péče.

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.
2. Indikační skupiny:

I	Nemoci onkologické
II	Nemoci oběhového ústrojí
III	Nemoci trávicího ústrojí
IV	Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
V	Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
VI	Nemoci nervové
VII	Nemoci pohybového ústrojí
VIII	Nemoci močového ústrojí
IX	Duševní poruchy
X	Nemoci kožní
XI	Nemoci ženské

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.
2. Obecná ustanovení.
3. Indikační skupiny:

XXI	Nemoci onkologické
XXII	Nemoci oběhového ústrojí
XXIII	Nemoci trávicího ústrojí
XXXIV	Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
XXV	Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
XXVI	Nemoci nervové
XXVII	Nemoci pohybového ústrojí
XXXVIII	Nemoci ledvin a cest močových
XXIX	Duševní poruchy
XXX	Nemoci kožní
XXXI	Nemoci gynekologické

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické

Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.

Nemoci ústrojí oběhového

EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).

Diabetes mellitus

Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 není nezbytný).

Nemoci ústrojí trávicího

Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních štáv.

Nemoci jater a žlučníku

Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.

Nemoci nervové

Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

Nemoci pohybového ústrojí

Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Nemoci ledvin a močových cest

Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů) Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.

Nemoci duševní

Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení) .

Ostatní nemoci

Příslušná odborná vyšetření.

Poznámka

U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy.
Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K-komplexní lázeňská péče

P-příspěvková lázeňská péče

N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podržením.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.
- 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.
- 9) Mimo hemofilickou artropatiю.
- 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

č. indikace dg.	I N D I K A C E	délka oš.doby	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
1/1 dle zákl dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 ¹⁾	P, K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M.Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	Františkovy L. Karlova Studánka Karlový Vary Luhačovice Mariánské Lázně

¹ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je
vhodná především u:

Vhodnost lázeňské léčby
je nutno zvážit
individuálně u:

M Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory
(*anus praeternalis* není
kontraindikací)
nádory horních cest dýchacích, hltanu a
hrtanu
nádory vnitřních rodidel
nádory mammy (láz. léčba je možná i při
probíhající dlouhodobé hormonální
terapii) .

mozkových a kožních nádorů, nádorů
žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí
a měkkých částí, nádorů štítné žlázy,
prostata.

Pokud je u nemocného s tímto postižením
shledána indikace k lázeňské léčbě, je
léčení možné v

U nádorů plic (primární bronchogenní ca)
lze doporučit láz. péči zpravidla až po
uplynutí 1 roku od skončení komplexní
léčby při trvající remisi stejně i u
nádorů ledviny (Grawitzův nádor).

Karlovy Vary, Luhačovice,
Karlova Studánka,
Karlovy Vary

Karlova Studánka, Luhačovice

Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně

Karlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)

Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova
Studánka

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

II - Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
II/1 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).	21 ²⁾	P, K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakováném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.	<u>Františkovy L.</u> <u>Jeseník</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/2 101, 109, 130, 133, 140, 141	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.	28	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>

² Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

1	2	3	4	5	6	7
II/3 dle zákl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady.	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/4 120, 124, 125	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/5 121, 122	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem) .	28 ³⁾	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	<u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>

³

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

1	2	3	4	5	6	7
II/6 125	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkčně postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/7 110, 111, 112, 113	Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout u HCH III.st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II.b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na doporučení internisty nebo kardiologa.	Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Jeseník</u> <u>Hodonín</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u>

1	2	3	4	5	6	7
II/8 170, 173 179	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.	Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u>
II/9 180, 183, 187, 189	Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetravávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.	2B	P		Opakování plicní embolie, rozsáhlé běrcové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u>

1	2	3	4	5	6	7
II/10 dle zákl. dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona č...o všeobecném zdravotním pojištění (dále jen "zákon")		<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Luháčovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u> <u>Karlova Studánka</u>
II/11 dle sákl. dg.	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Sířokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Kanstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/12 dle zákl. dg.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u>

III - Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
III/1 K20, K21, K22, K29, K30	Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori .	21	P		Kouření, absus alkoholu, léků.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

1	2	3	4	5	6	7
III/2 K25, K26 K27, K28	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexně lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření,abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/3 dle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, absus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/4 dle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na doporučení gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitách.	Absus kodeinu a příbuzných látek.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

1	2	3	4	5	6	7
III/5 K50, K51	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>
III/6 dle zákl. dg.	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga do 6 měsíců po operaci.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>

1	2	3	4	5	6	7
III/7 K80, K81, K82, K83 B66	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexně lázeňskou péčí lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známk cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luháčovice</u>

III/8 dle zákl. dg.	<p>Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiažu žlučových cest.</p> <p>Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.</p>	21	P, K	<p>Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis.</p> <p>Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodu (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomozza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.</p>	<p>Absus kodeinu a příbuzných láttek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy).</p> <p>Biochemické známky cholestázy.</p>	<p><u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u></p>
------------------------------	--	----	------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
III/9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxicém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.	<u>Karlovy Vary</u>
III/10 K85, K86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Bílina</u>

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IV /1 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění – edukační program.	14 ⁴⁾	K	Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakováný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Lipová-Lázně</u>

⁴

Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

1	2	3	4	5	6	7
IV/2 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg, k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně Poděbrady
IV/3 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.	21	K, P	Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.	Pokročilé stadium diabet. komplikací.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Lipová -Lázně</u> <u>Poděbrady</u>
IV/4 E65, E66, E68	Obesita.	21	N	Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady

1	2	3	4	5	6	7
IV/5 E78	Hyperlipoproteinemie II - V. typu.	21	P	Případy mimo indikaci II/1.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6 EO5	Tyreotoxikóza.	21	P		Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová-Lázně
IV/7 EO5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
IV/8 D35	Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.		<u>Jeseník</u>

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V/1 dle zákl. dg	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyemy, píštěle.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně
V/2 J31, J32, J35, J37	Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení otorinolaryngologa v případě ozaeny.	Hnisavé záněty PND vyžadující chir.léčbu, neléčený rhinosclerom.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně

1	2	3	4	5	6	7
V/3 J37, J38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u>
V/4 J30	Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V/5 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/6 J40, J41, J42, J47	Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce	21 ^{1) 5)}	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakováně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/7 J43, J44	Obstruktivní chronická bronchitis.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V/8 J45	Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prám. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstričním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu) .		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/9 dle zákl. dg.	Interstitialní plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokoniáz všech stádií.	28 ³⁾	K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V/10 dle zákl. dg.	Následky poškození resp. toxicke účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	2B ³⁾	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst.7 zákona.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VI/1	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní 1.1. lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je mocné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinic- kého stavu nebo pro zpomalení		<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u>
G51, G52 G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96	polyradikuloneuritid, postpoliomielitický syndrom.				<u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>	

⁶

Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

1	2	3	4	5	6	7
				<p>progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.</p>		
VI/2 G59, G60, G61, G62, G63, G64	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.		<p>Bílina <u>Dubí</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> Mšené <u>Klimkovice</u> Teplice <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u></p>

1	2	3	4	5	6	7
VI /3 G54 , G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P , K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd. , nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zátkroku.		<u>Bělohrad</u> <u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Kundratice Libverda Mariánské Lázně <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>

VI/4 G04, G05, G09	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva /stavy po meningoencefalitidách a myelitidách/ pokud jsou přítomny spasticko-paretické známky.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.		<u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
------------------------------	--	------------------	------	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7
VI/5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovánou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Mšené</u> <u>Velká Losiny</u> <u>Vráž</u>

1	2	3	4	5	6	7
VI/6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexně lázeňské péče je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.		<u>Bělohrad</u> ⁷⁾ <u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Jáchymov</u> ⁷⁾ <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/7 G35, G36, G37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku	<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

⁷

Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

1	2	3	4	5	6	7
VI/8 G11, G12, G13, G24.9 G60, G70.9 G71, G72; G73	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	21 ⁶⁾	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	<u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/9 G95	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VI/10 G80, G81, GB2, G83	Dětské mozkové obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	21 ¹⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/11 620, G21	Parkinsonova choroba.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u> <u>Libverda</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>

VII – Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VII/l M05, M06, M08, M09	Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).	21 ^{3) 5)}	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b".	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Hodonín</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/2 M45	Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba).	21 ³⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b" soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/3 M02, M03 M06, M07	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 ³⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Lipová-Lázně⁸⁾</u> <u>Mšeň</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u> <u>Kostelec</u>
VII/ 4 M32, M33, M34, M35	Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	21 ³⁾	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažně viscerální postižení včetně postižení CNS.	<u>Jáchymov</u> <u>Lipová-Lázně⁸⁾</u> <u>Teplice</u> <u>Klimkovice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/5 M12, M14 M36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	Bělohrad ⁹⁾ Darkov ⁹⁾ Jáchymov Kundratice ⁹⁾ <u>Teplice</u> Třeboň ⁹⁾ Velichovky ⁹⁾ <u>Klimkovice</u>
VII/ 6 M10, M11 M14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá arthritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.		Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Jáchymov Karlov Vary <u>Kundratice</u> Mariánské Lázně <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> Toušeň Třeboň Velichovky

1	2	3	4	5	6	7
VII/7 M80, M81, M82	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst. 7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Slatinice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/8 dle zákl. dg.	Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bludov</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Luháčovice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/9 M16	Koxartróza v soustavném léčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/10 M17, M22, M23	Gonartróza v soustavném léčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Těžké destruktivní změny.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/11 M15, M18, M19	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních koubů) .	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/12 M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.	Kompresivní radikulární syndrom.	Běloves <u>Bílina</u> Bludov <u>Bechyně</u> Bělohrad <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> Dubí <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> Konstantinovy L. <u>Kundratice</u> Karviná Klimkovice Karlovy Vary Kostelec <u>Libverda</u> Luhačovice Mariánské Lázně <u>Mšené</u> Ostrožská N.Ves Poděbrady Slatinice <u>Teplice</u> Teplice n.B. <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> Vráž

1	2	3	4	5	6	7
VII/13 M41	Skoliozy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.	21 ^{1) 5)}	P, K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.		<u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>
VII/14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	21 ^{1) 5)}	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad</u> Bludov <u>Bohdaneč</u> Darkov <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Bechyně</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené</u> Teplice <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Slatinice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/15 dle zákl. dg.	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 ¹⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>
VII/16 dle zákl. dg.	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 ¹⁰⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopéda, je-li nezbytné nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.		<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>

VIII - nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII/1 dle zákl. dg.	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150umol/l.		<u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
VIII/2 N20, N21, N22	Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciozy.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa do 6 měs /alt. 12 měs/ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/ 4 N34, N40, N41, N42	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			Mariánské Lázně

1	2	3	4	5	6	7
VIII/5 dle zákl. dg.	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu	21	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa		<u>Mariánské Lázně</u>

IX – Duševní poruchy

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX/1 F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy v stádiu remise.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>

1	2	3	4	5	6	7
IX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, FO6.6, FO6.7 FO7.1 FO7.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u> Libverda

X – Nemoci kožní

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X/1 L20	Atopický ekzém.	28 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/2 L40	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová-Lázně Kostelec Ostrožská N.Ves

X/3 L40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativnou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na doporučení revmatologa.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u> <u>Ostrožská N.Ves</u>
X/4 L70	Acne conglobata et indurata.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na doporučení dermatologa nemocným do 25 let		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>

X/5 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout výjimečně, na doporučení dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalisace.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/6 dle zákl. dg.	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smrštování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 ¹⁾	K	Léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Lipová-Lázně</u>

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI/1 N96, N97	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

XI/2 E28, N85, N91	Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI/3 N70, N71, N72, N73 N76	Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P, K	Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

XI / 4 dle zákl. dg.	Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.		<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI / 5 N94, N95	Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).	28	P			<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Jeseník</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohrad	pro děti od 6 let a dorost; léčba dětí od 3 let je možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 6 let a dorost
Janské Lázně	pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Lipová	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost

Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.	pro děti od 3 let a dorost
Teplice	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnice	pro děti od 3 let a dorost
Klimkovice	pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu děti a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXI/1 dle zákl. dg.	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Janské Lázně	

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavý bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/I0 vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/1 I00, I01 I02	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymízení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/2 I40	Stavu po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymízení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/3 I05, I06, I07, I08, I09, I33, I41, I42	Chronické karditidy.	Poděbrady Teplice n. B.	

XXII/4 Q20-Q26	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/5 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/6 I10,M35	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/7 F45	Neurocirculační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/8 I10,I11, I12 ,I13	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady Teplice n. B. Klimkovice
XXII/9 I77,I78, I79	Nemoci periferních cév.	Poděbrady Klimkovice Teplice n. B.
XXII/10 dle zákl . dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady Teplice n. B.

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci

XXIII/2	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. zákl. enterokolitidy včetně dg. M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. dle hepatitidy, cirhózy ve stavu zákl. kompenzace, toxicická dg. poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost
XXIII/4	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči dle a biliární sekrece, chron. zákl. cholecystitidy, biliární dg. dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis
XXIII/5	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní dle pankreatitis, chron. zákl. pankreatitis, pankreatická dg. achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1 E10, E11, E12, E13	Diabetes mellitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizovaný diabetes
XXIV/2 E65, E66, E68	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 E78	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 EO5	Tyreotoxikóza.	Jeseník	
XXIV/5 EO5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/1 J31, J32, J35, J37, J38, J39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny	

XXV/2	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J30		
XXV/3	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J40, J41, J42		
XXV/4	Sinobronchitis.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J32, J40, J42		
XXV/5	Rekonvalescence po zánětu plic opakováném v průběhu J12, J13, posledních 2 let. J14, J15, J16, J17, J18	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J12, J13, posledních 2 let. J14, J15, J16, J17, J18		
XXV/6	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J44, J45		
XXV/7	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J45		
XXV/8	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J42, J44		

XXV/9	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic. dle zákl. dg.	Janské Lázně, Jeseník Kynžvart Luhačovice, Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/10	Intersticiální plicní fibróza. dle zákl. dg.	Jeseník Kynžvart, Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/11	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic. dle zákl. dg.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVI/1	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). dle zákl. dg. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovice	
XXVI/2 G11-13, G24.9, G71-73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Klimkovice	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci

XXVI/3 G80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 G05, G06, G08, G09, G11, G12, G54, G55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G54, G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 M08, M09	Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n.B. Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	

XXVII/3	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při dle poruše motorických funkcí do zákl. 36 měsíců po úrazu nebo dg.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	
XXVII/4	Skoliozy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	
M41			
XXVII/5	Osteochondrózy ve stádiu reparačním.	Darkov Teplice	
M91, M92	Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Poděbrady ^{x)}	
XXVII/6	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
M42			
XXVII/7	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplice	Stavy s píštělí
M86			
XXVII/8	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Jánské Lázně Teplice Darkov Velké Losiny	
M50, M51, M53, M54, M42			

^{x)} pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Mar. Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXVIII/2	Urolitiáza – po operaci nebo spontánním odchodu	Mar. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
N20, N21,	konkrementu		
N22, N23	– s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, – recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možnosti sdělit chemické složení konkrementu.		
XXVIII/3	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu dle zákl. dg.)	Bludov Mar. Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4	Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček	Mar. Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod.
N02, N03	(glomerulonefritis, lipoidní nefroza, hereditární		kreatininemie nad 150 umol.
N04	nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.		diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXIX – Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
-------	----------	-------	----------------

XXIX/1	Psychózy ve stádiu remise. F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
--------	---	---------	---

XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád
F40, F41,			
F42, F43,			
F45, F48,			
F51, F54,			
F06.6,			
F06.7,			
F07.1,			
F07.2			

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart	
L40		Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/2	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického,	Darkov	Impetiginizace,
L20, L23	chronické prurigo.	Jeseník Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	mikrobiální ekzémy
XXX/3	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	
L70			
XXX/4	Sklerodermie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
L94			
XXX/5	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
L85			
XXX/6	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
dle zákl. dg			

XXXI/7 Stavy po popáleninách a po
rekonstrukčních výkonech,
dle kde hrozí smršťování jizev.
zákl. Železnice
dg.

Bělohrad
Janské Lázně
Lipová-Lázně
Železnice

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXXI/1 N70, N71 N72, N73, N74, N75, N76, N77	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	
XXXI/2 N85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N91, N92, N93, N94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo- oligo-menorea.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/4 N92	Stavy po léčených juvenilních metrorragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně Klimkovice	Hyperestrogen ní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.)	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	